



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ

- ❖ Отравления грибами наиболее часто случаются, когда ядовитые грибы имеют внешнее сходство со съедобными и случайно вместе с ними попадают на стол.
- ❖ Чтобы этого избежать, необходимо хорошо знать общие признаки грибов и изучить характерные отличия ядовитых видов.
- ❖ Собирать нужно только известные вам виды грибов. Сомнительные, и тем более неизвестные, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу.
- ❖ В период лесных прогулок родители должны осуществлять строжайший надзор за детьми при сборе грибов и использовании их в пищу.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ГРИБНИКОВ

Чтобы избежать отравления ядовитыми грибами, нужно собирать только те грибы, которые вы хорошо знаете.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ



МУХОМОР КРАСНЫЙ

- ❖ Растёт в хвойных, лиственных и смешанных лесах, особенно в березняках. Встречается часто и обильно одиночно и большими группами с июня до осенних заморозков.

- ❖ Шляпка до 20 см, сначала шаровидная, затем плосковыпуклая, ярко-красная, оранжево-красная, поверхность усеяна белыми или слабо-желтыми многочисленными бородавками.

- ❖ Мякоть белая, под кожицей желтоватая, мягкая, без запаха. Пластинки частые, свободные, белые.

ЛОЖНООПЕНОК СЕРНО-ЖЕЛТЫЙ

- ❖ Шляпка диаметром 2—5 см, желтоватая, в центре более темная с красноватым оттенком, сначала выпуклая, затем распростертая..

- ❖ Ножка высотой 5—7 см, толщиной 0,5 см, ровная, полая, волокнистая, серно-желтая, у основания бурая. Мякоть светло-желтая, тонкомясистая. Вкус горький, запах тяжелый, неприятный.

- ❖ Встречается часто, большими группами, на пнях и около них, на гнилой древесине. Плодоносит с июня по ноябрь. Серно-желтый опенок отличается зеленоватой окраской спор.





ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ

САТАНИНСКИЙ ГРИБ



- ❖ Растет в светлых дубняках и широколиственных лесах на известковой почве.
- ❖ Шляпка 10-20 см в \varnothing , подушковидная, серовато-белая, бледно-охристо-белая с оливковым оттенком, сухая, мясистая.
- ❖ Мякоть бледная, почти белая, на разрезе слабо синеющая. Устья трубочек красные.
- ❖ Ножка 6-10 см длины, 3-6 см, желтая с красной сеточкой. Запах противный, особенно у старых плодовых тел. Имеет сетчатый рисунок с округлыми ячейками. Споры веретеновидно-эллипсоидные.
- ❖ Ядовит. Может быть спутан с дубовиком, растущим тоже в дубовых лесах.

БЛЕДНАЯ ПОГАНКА



- ❖ Растёт в хвойных и широколиственных лесах, березняках, дубравах одиночно и группами с июня до осенних заморозков. Встречается редко.
- ❖ Шляпка до 10 см, сначала колокольчатая, затем плосковыпуклая, светло-зеленая, белая, желтовато-буро-оливковая, в середине обычно более темная, с шелковистым блеском, в сырую погоду слизистая, иногда с белыми хлопьями на поверхности.
- ❖ Мякоть белая, тонкая, без запаха